

## ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К ПРИВИВКЕ

- 1) Перед первой вакцинацией АКДС- вакциной необходимо сделать общий анализ крови и общий анализ мочи
- 2) При наличии у ребенка аллергических заболеваний (диатез, пищевая аллергия) заранее обсудите с врачом схему профилактики аллергических реакций на прививку
- 3) Приобретите в домашнюю аптечку детские жаропонижающие средства
- 4) Не вводите в рацион ребенка новые продукты за неделю до вакцинации и в течение 7 дней после.
- 5) Поинтересуйтесь у врача, от чего и какой именно вакциной сегодня будут прививать ребенка.
- 6) Не стесняйтесь задать вопросы врачу, если у вас есть какие-то сомнения относительно прививки.
- 7) Если у Вашего ребенка после постановки прививки поднялась температура, дайте ему детское жаропонижающее средство
- 8) Не вводите новых продуктов в рацион ребенка (и свой, если ребенок находится на грудном вскармливании). Это можно будет сделать на 7-е сутки после прививки и позже.
- 9) В случае прививки живыми вакцинами (капли полиомиелитной вакцины ОПВ, коревая, паротитная, краснушная) побочные реакции (небольшое повышение температуры, насморк) могут возникать у 5% на 7-21 сутки после вакцинации.
- 10) Если была проведена проба Манту — старайтесь не мочить место постановки пробы в течение 72 часов. Также следует ограничить в рационе такие продукты как: шоколад, цитрусовые, орехи, соки до момента проверки пробы.